

大麻は有害であるという主張は以下のように大別される

### 服用時の向精神作用そのものが有害である

「集中力が落ちて事故が増える」「幻覚により高所から飛び降りる」など

### 不純物による健康被害が問題である

「煙には発がん物質が多く含まれる」など

### 長期的な健康被害

「脳が委縮する」「胎児に悪影響」など（上記の発がん作用は除く）

### 社会不安を増す

「他のドラッグの入り口となる」「麻薬欲しさに犯罪が増える」「生産性が落ちる」など

当然、これらの主張は排他的なものではない。

情報引用元：

メルクマニュアル（米国医薬品企業メルク）

<http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch108/ch108f.html>

薬物乱用防止教室（千葉県警）

[http://www.police.pref.chiba.jp/safe\\_life/overuse\\_drugs/hemp.php](http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/overuse_drugs/hemp.php)

コメント

- ・服用時の向精神作用そのものが有害である「集中力が落ちて事故が増える」「幻覚により高所から飛び降りる」など...これ本当？ソースないの？嘘や噂をのせても意味ないだろ？ -- nobita (2009-07-15 18:16:53)
- ・根拠がないですね。 -- 名無しさん (2009-10-21 01:33:31)
- ・おれもインドやネパールで聞いたことはありますが、論拠には乏しいですよ -- kazu (2010-04-30 01:35:24)
- ・THCのマウスの経口摂取によるLD50は1270mg/kg, エチルアルコールは10000mg/kg, ニコチンは1 mg/kg, ポツリヌスは0.00001mg/kg, LD50に着目するならアルコールより危険。 -- 名無しさん (2012-01-30 19:47:55)

名前:	<input type="text"/>
コメント:	<input type="text"/>

投稿