

【妊婦でも大麻を使用すると危険】

大麻は母親だけでなく、胎児や乳幼児に対して非常に有害です。乳児が直接煙を吸引しなくても、母乳などからのTHC中毒になる可能性があります。大麻は特に子供の知的発育を阻害します。

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1746958.stm>

<http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch108/ch108f.html>

【大麻を使用すると、鬱、パラノイア、統合失調症などの精神病を患う可能性が激増】

さらに重度の精神疾患から、自殺の可能性も健常者の数倍に跳ね上がります。

<http://www.schizophrenia.com/prevention/cannabis.marijuana.schizophrenia.html>

大麻を吸引する人の精神病発症リスクは、そうでない人より40%も高い

<http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2261015/1942881>

Cannabis boosts risk of psychosis(Nature2004年11月29日)

<http://www.nature.com/news/2004/041129/full/news041129-7.html>

Using cannabis during adolescence or early adulthood increases the risk of developing psychotic symptoms, according to a study that tracked almost 2,500 young people.

Crucially, those who are already predisposed to such problems are at a disproportionately greater risk when using the drug.

(大麻は精神病のリスクをブーストする by ネイチャー

2500人の若者を追跡調査した結果によれば、思春期あるいは初期の青年期に大麻を使用することは精神病の症状を促進させる危険性を増加させます)

大麻精神病

- ・ イギリス都市部の精神病院では、大麻が原因とみられる精神病患者でいっぱいになっています。

<http://www.mentalhealthcare.org.uk/content/?id=30>

- ・ 薬物データベース

「慢性的な摂取は、じょじょに精神に障害を及ぼします」

<http://www.dapc.or.jp/data/taima/3-2.htm>

メルクマニュアル医学百科の記述

- ・ 嗜癖に伴う問題行動
- ・ 錯乱
- ・ パニック反応
- ・ 中毒性精神病
- ・ 統合失調症(精神分裂病)
- ・ テストステロン値低下
- ・ 精巣萎縮
- ・ 精子減少
- ・ 月経不順
- ・ 新生児の体重低下
- ・ デルタ 9 THCの母乳混入による、乳児の中毒
- ・ マリファナの使用中止によるけいれん性の動きや不眠

<http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch108/ch108f.html>

コメント

- ・ 被験者に偏りが有ったら数字でごまかせるデータだろうな。 -- 麻太郎 (2011-01-04 23:31:36)

名前:	<input type="text"/>
コメント:	<input type="text"/>

投稿